



scala 1:20.000

LEGENDA

1 - SUPERFICI ARTIFICIALI			
1.1 -	Zone urbanizzate di tipo residenziale		3.1.1.2.3 - Boschi ripariali ad alto fusto a dominanza di pioppi (<i>Populus sp.pl.</i>), salici (<i>Salix sp.pl.</i>) e/o altre specie igrofile
1.1.1 -	Zone residenziali a tessuto continuo		3.1.1.3 - Boschi di latifoglie non native a dominanza di robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>) e/o ailanto (<i>Allanthus altissima</i>)
1.1.2 -	Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado		3.1.2 - Rimboschimenti a prevalenza di conifere
1.2 -	Insedimenti produttivi, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali *		3.1.3 - Rimboschimenti misti di conifere e latifoglie
1.3 -	Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati *		3.1.4 - Rimboschimenti a prevalenza di latifoglie
1.4 -	Zone verdi artificiali non agricole		3.2 - Vegetazione arbustiva e/o erbacea
2 - SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE			
2.1 -	Seminativi avvicendati e prati stabili		3.2.1 - Pascoli naturali e praterie
2.1.1 -	Seminativi in aree non irrigue e prati stabili (comprendono anche vivai, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue)		3.2.2 - Cespuglieti a locale prevalenza di ginestra (<i>Spartium junceum</i>), pruno selvatico (<i>Prunus spinosa</i>), rovo (<i>Rubus ulmifolius</i>), olmo (<i>Ulmus minor</i>), canna (<i>Arundo pliniana</i>)
2.1.2 -	Seminativi in aree irrigue (comprendono anche vivai, colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue)		3.2.3 - Canneti (<i>Phragmites australis</i> e/o <i>Arundo donax</i>)
2.2 -	Colture permanenti		3.2.4 - Cespuglieti a prevalenza di specie sclerofile sempreverdi
2.2.1 -	Vigneti		3.2.4.1 - Macchia alta a locale prevalenza di fillirea (<i>Phillyrea latifolia</i> , <i>P. angustifolia</i>), erica (<i>Erica arborea</i>), corbezzolo (<i>Arbutus unedo</i>) e leccio (<i>Quercus ilex</i>)
2.2.2 -	Frutteti e frutti minori		3.2.4.2 - Macchia bassa e garighe con mirto (<i>Myrtus communis</i>), lentisco (<i>Pistacia lentiscus</i>), e cisti (<i>Cistus sp.pl.</i>)
2.2.3 -	Oliveti		3.2.4.3 - Ginepreti dunari (<i>Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa</i> e/o <i>Juniperus phoenicea</i>)
2.2.4 -	Altre colture arboree (pioppeti, noceti, arboricoltura da legno, conifere a rapido accrescimento, etc.)		3.3 - Zone aperte con vegetazione rada o assente
2.3 -	Zone agricole eterogenee		3.3.1 - Spiagge, dune, sabbie
2.3.1 -	Sistemi colturali e particellari complessi e colture temporanee associate a colture permanenti		4 - ZONE UMIDE
2.3.2 -	Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti		4.1 - Zone umide interne
3 - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI			5 - CORPI IDRICI
3.1 -	Boschi		5.1 - Acque continentali
3.1.1 -	Boschi di latifoglie		6 - AREE CENSURATE
3.1.1.1 -	Boschi a prevalenza di latifoglie sempreverdi		
3.1.1.1.1 -	Boschi a prevalenza di leccio (<i>Quercus ilex</i>), talvolta con alloro (<i>Laurus nobilis</i>)		
3.1.1.1.2 -	Boschi a prevalenza di sughera (<i>Quercus suber</i>)		
3.1.1.2 -	Boschi a prevalenza di latifoglie decidue		
3.1.1.2.1 -	Querceti misti a locale dominanza di cerro (<i>Quercus cerris</i>), farnetto (<i>Q. frainetto</i>), roverella (<i>Q. pubescens s.l.</i>)		
3.1.1.2.2 -	Boschi misti a locale dominanza di carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), castagno (<i>Castanea sativa</i>), carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>), olmo (<i>Ulmus minor</i>)		
			Classi di copertura per le sottoclassi 31:
			a < 40%
			b 40% - 70%
			c > 70%
			* Le sottoclassi 1.2 e 1.3 non sono state cartografate quando risultano intercluse nella sottoclasse 1.1.1.
VARIANTE DI TRACCIATO			
	Infrastruttura elettrificata		
	Nuova viabilità		
	Sottostazione (SSE)		